

ANRS SHS 99 METHAVILLE : Impact de la primo prescription de méthadone en médecine de ville sur les pratiques à risque de transmission du VHC

Thématique Sciences sociales et santé publique

Objectif Comparer, en terme d'équivalence, le recours quotidien à l'injection de drogues après un an de traitement (phase essai), chez des patients dépendant aux opiacés ayant bénéficié de deux modes d'initiation distincts d'un traitement par la méthadone : médecine de ville versus Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSST). Après une stabilisation du dosage prescrit, les patients auront la possibilité de choisir le lieu de prise en charge parmi les centres et les investigateurs inclus dans l'étude (les 2 bras initiaux peuvent donner lieu à 4 groupes possibles). Les objectifs secondaires consistent à comparer entre les groupes et au cours des 3 ans de suivi, la prévalence des pratiques à risque de transmission du VHC et l'efficacité du traitement mesurée en termes d'observance au traitement, de prévalence des pratiques addictives, d'évolution du niveau d'insertion sociale, de qualité de vie, de prévalence des comorbidités psychiatriques, de criminalité, de satisfaction à l'égard du traitement et de coût efficacité

Responsable Scientifique Patrizia Carrieri

Laboratoire/Hôpital/Institut ORS PACA – UMR912 INSERM-IRD

Ville Marseille

Date de début de la recherche 01/12/2008

Date de fin de la recherche 31/05/2011

Situation Terminé

Appel d'Offres 2008-2

Publications Roux P, Michel L, Cohen J, Mora M, Morel A, Aubertin J-F, et al. Initiation of Methadone in primary care (ANRS-Methaville): a phase III randomized intervention trial. *Bmc Public Health*. 2012; 12:488.