

ANRS 0496s - FraGerCare-WA

Information destinée aux chercheurs

Titre : Fragilité, syndromes gériatriques et parcours de soins des personnes âgées selon le statut VIH en Afrique de l'Ouest

En bref	Investigateur : Dr. Raoul Moh/ Dr. Clotilde Allavena
	Structure/équipes : Programme PAC-CI, raoul.moh@pac-ci.org CHU de Nantes, clotilde.allavena@chu-nantes.fr
	Dates de démarrage : Juillet 2026 Date de Fin de la recherche : Aout 2029
	Nombre de participants attendus : Volet clinique : 600 participants (300 VIH+ et 300 VIH-) Volet "sciences sociales" : une trentaine de personnes âgées de 60 ans et plus, une dizaine d'aidants et l'ensemble des soignants impliqués
	Statut de la recherche : En cours
	Pathologie : VIH et vieillissement
	Promotion : Inserm - ANRS MIE
	Financé dans le cadre de : AAP 2023-2
Le projet	Le projet FRAGERICARE dont l'objectif est de comparer la prévalence de la fragilité chez les personnes âgées de 60 ans et plus infectées par le VIH (VIH+) ou non (VIH-) en Afrique de l'Ouest. Cette recherche vise à étudier les syndromes gériatriques chez les personnes âgées de 60 ans et plus selon leur statut VIH, à analyser les systèmes d'aide et les perceptions du vieillissement par les personnes âgées, leurs proches et les soignants. Il s'agit également d'étudier la mise en œuvre et l'intégration du dépistage des syndromes gériatriques dans la prise en charge courante des personnes vivant avec le VIH.
Dernières actualités (le cas échéant)	
Références des Publications (le cas échéant)	
Type d'étude	RIPH2 Etude à méthodes mixtes associant : - Un volet "clinique" comportant une étude transversale à 2 strates (VIH+ et VIH-), comparative, internationale (Côte d'Ivoire-Burkina Faso-Togo), multicentrique ; - Un volet « sciences sociales » portant sur différents aspects de la prise en charge gériatrique combinant une enquête transversale quantitative et une recherche qualitative comportant des entretiens individuels et des focus group avec des personnes âgées de 60 ans et plus, leur entourage et des soignants.
Objectifs principaux	Comparer la prévalence de la fragilité chez les personnes âgées de 60 ans et plus infectées par le VIH (VIH+) ou non (VIH-) en Afrique de l'Ouest.

Objectifs secondaires	1. Comparer la prévalence des syndromes gériatriques, notamment la dépendance, les troubles cognitifs, visuels, auditifs, la dépression, la dénutrition, la déshydratation, la douleur, les troubles de la continence urinaire et fécale, les troubles de la marche et de l'équilibre, selon le statut VIH ; 2. Identifier chez les personnes âgées de 60 ans et plus les facteurs associés à la présence de syndromes gériatriques, y compris le statut VIH ; 3. Décrire les systèmes d'aide et de solidarité, formels et informels, disponibles pour l'accompagnement et la prise en charge en santé des personnes âgées de 60 ans et plus ; 4. Décrire les perceptions et représentations par rapport au vieillissement et aux syndromes gériatriques des personnes âgées de 60 ans et plus par leurs entourages (familles, amis), les soignants et elles-mêmes ; 5. Evaluer la mise en œuvre et l'intégration du dépistage des syndromes gériatriques dans la prise en charge de routine des personnes vivant avec le VIH.
Optionnel : Lien site web de la recherche	
Critères d'inclusion	• Groupe VIH+ ✓ Personne âgée de 60 ans et plus ✓ Infectée par le VIH-1 et/ou 2 ✓ En capacité de se déplacer dans le lieu de recueil des données ✓ Ayant donné son consentement libre et éclairé • Groupe VIH- ✓ Personne âgée de 60 ans et plus ✓ Non infectée par le VIH ✓ En capacité de se déplacer dans le lieu de recueil des données ✓ Ayant donné son consentement libre et éclairé
Critères de non-inclusion	• Personne privée de liberté (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) • Indice de Karnofsky < 50% • Personne hospitalisée
Critères de jugement principal	Prévalence de la fragilité selon le statut sérologique VIH chez les personnes âgées de 60 ans et plus en Afrique de l'Ouest
Critères de jugement secondaires	✓ Prévalence de la fragilité chez les personnes âgées de 60 ans et plus. ; ✓ Nombre et proportion de personnes âgées de 60 ans et plus présentant un syndrome gériatrique notamment, des troubles cognitifs, visuels, auditifs, la dépression, la dénutrition, la déshydratation, la douleur, les troubles de la continence urinaire et fécale, les troubles de la marche et de l'équilibre selon le statut VIH ; ✓ Nombre et proportion de personnes âgées de 60 ans et plus présentant au moins une comorbidité, notamment un cancer, une dyslipidémie, un diabète, une hypertension artérielle, un antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, une maladie ostéo-articulaire, une insuffisance rénale, selon le statut VIH ; ✓ Facteurs associés à la présence de syndromes gériatriques.

A – Méthodologie de l'étude et type de données et/ou échantillons collectés

B – Modalités d'accès à la collection

A – Méthodologie de l'étude et type de données et/ou échantillons collectés

Données et des échantillons collectés	Biothèques	Plasma/ sérum
	Données	Cliniques, biologiques,

C'est une étude de type transversal sans suivi des participants.

B – Modalités d'accès à la collection

1- soumission du projet : **via le formulaire de demande d'échantillons du site web**

2- évaluation du projet : **comité scientifique ou experts indépendants**

3- Mise à disposition de la collection : **décision finale direction ANRS MIE ou conseil scientifique**

Adresse e-mail de contact pour la soumission de votre projet : **biobanque@anrs.fr**